


แนวทางการ Refer ผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดชัยภูมิ



หมายเหตุ **ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/เสี่ยงก้าวร้าว/เสี่ยงฆ่าตัวตาย/อาการไม่คงที่ ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยในกลุ่มดังต่อไปนี้

1. มีประวัติเข้าได้กับโรคซึมเศร้าหรือมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย โดยผลการประเมิน $9Q \geq 19$ (severe depression) หรือ ผลการประเมิน $8Q \geq 8$ (moderate risk for suicide)
2. มีประวัติพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ในช่วงที่มีอาการเจ็บป่วยครั้งนี้ เช่น พฤติกรรมทำร้ายตัวเอง พฤติกรรมทำร้ายผู้อื่น พฤติกรรมอาละวาดทำลายสิ่งของ
3. มีประวัติขาดสุรา ร่วมกับประเมิน AWS Score ≥ 15 คะแนน (severe)
4. ผู้ป่วยมีประวัติรับยาทางจิตเวช กลุ่ม Antipsychotics หรือ Lithium หรือ Valproate และมีอาการที่อาจเป็นผลข้างเคียงจากยา เช่น มือสั่น ลิ้นแข็ง ตัวแข็งเกร็ง คอแข็ง กระวนกระวายอยู่นิ่งไม่ได้ ง่วงซึม ไข้สูง เพ้อสับสน ชักเกร็ง ท้องเสีย อาเจียน เดินเซ ปัสสาวะไม่ออก หรือได้รับยาจิตเวช และมีอาการที่ต้องสงสัยว่าแพ้ยา