

ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ (upper airway obstruction)

ประเมินและให้คะแนนตาม score

อาการแสดงทางคลินิก	0	1	2
1.ระดับการรู้สติ	ปกติ	กระสับกระส่าย	หมดสติ
2.เสียง stridor	ไม่มี	Inspiratory stridor	Biphasic stridor
3.Heart rate	60-120/min	120-140/min	>140 or <60 /min
4. Accessory muscle	ไม่มีอาการจุกบานหรือหน้าอกพอง	จุกบานหรือ suprasternal retraction	1+ intercostan and subcostal retraction
5. Cyanosis	ไม่มี หรือ o2 sat on room air 95-100 %	มีใน Room air หรือ O2 sat on room air < 95-100 %	มีขณะได้รับ O2 sat <95 ขณะ On O2

Score = 0

Score ≥1-4

Score ≥5

- oxygen supplement
- Bed rest และนอนยกศีรษะสูง30 องศา
- bronchodilator / adrenaline NB ตามดุลพินิจของแพทย์
- observe การหายใจต่อ อย่างใกล้ชิด

- notify แพทย์ทันที
- oxygen supplement
- Bed rest และนอนยกศีรษะสูง30 องศา
- bronchodilator / adrenaline NB ตามดุลพินิจของแพทย์
- observe การหายใจต่อ อย่างใกล้ชิด
- NPO, IV access

-เตรียมอุปกรณ์ใส่ ET tube  
+/- set OR for tracheostomy Emergency

-เตรียมอุปกรณ์ใส่ ET tube  
- เตรียมอุปกรณ์ resuscitation  
+/- set OR for tracheostomy Emergency or tracheostomy Bedside